

## ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

### Neo-Capsiderm

maść

Lek przeznaczony dla dorosłych.

Wielkość opakowania: 30 g

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Neo-Capsiderm ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po dwóch dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

#### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Neo-Capsiderm i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-Capsiderm
3. Jak stosować lek Neo-Capsiderm
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Neo-Capsiderm
6. Inne informacje

### 1. CO TO JEST LEK NEO-CAPSIDERM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Neo-Capsiderm stosowany jest jako środek rozgrzewający w bólach mięśniowych (naciągnięcia, bolesne skurcze mięśni), pomocniczo w bólach przy stanach zapalnych stawów oraz w nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).

Lek wtarty w skórę wywiera działanie drażniące na skórę, wywołując jej przekrwienie i zaczerwienienie, działa rozgrzewająco. Rozszerzenie naczyń krwionośnych powoduje lepsze ukrwienie obolałego miejsca i szybsze ustępowanie obrzęków i stanów zapalnych. W wyniku ustępowania stanu zapalnego stopniowo ustępują dolegliwości bólowe.

### 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEO-CAPSIDERM

#### Kiedy nie stosować leku Neo-Capsiderm

- nie stosować leku u dzieci;
- nie stosować na uszkodzoną skórę;
- nie stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którąkolwiek z substancji czynnych (w szczególności na noniwamid) lub pomocniczych (w szczególności na lanolinę) oraz uczulenia na przetwory z pieprzowca. W przypadku wystąpienia objawów uczulenia charakteryzujących się powstaniem wysięków lub wysypki, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania.

#### Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neo-Capsiderm

- po nałożeniu leku należy dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, zmywając pozostały na dłoniach lek;
- na początku terapii można odczuwać mrowienie, pieczenie, w żadnym wypadku nie należy brać gorącej kąpieli przed lub po nałożeniu leku, gdyż może to pogłębić odczucie mrowienia, pieczenia;
- w przypadku dłużej utrzymującego się rumienia lub wystąpienia obrzęku należy przerwać stosowanie leku, zaleca się przemyć skórę wodą utlenioną i skonsultować się z lekarzem.

## **Stosowanie innych leków**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Brak dostępnych danych dotyczących interakcji.

## **Ciąża i karmienie piersią**

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie stosować leku w czasie ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

## **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

## **Ważne informacje o niektórych składnikach leku Neo-Capsiderm**

Lek zawiera lanolinę, która może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).

## **3. JAK STOSOWAĆ LEK NEO-CAPSIDERM**

Stosować zewnętrznym na skórę.

Dorośli: niewielką ilość maści delikatnie wmasować w bolące miejsca 1 – 2 razy dziennie.

Odstępy między kolejnymi aplikacjami maści powinny być nie mniejsze niż 4 godziny. Stosować nie dłużej niż przez okres 2 dni. Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, zmywając pozostałości maści. W trakcie nanoszenia produktu bezwzględnie unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Przerwa przed ponownym zastosowaniem na to samo miejsce musi wynosić przynajmniej 14 dni.

Uwaga: przy dłuższym stosowaniu w tym samym miejscu może nastąpić uszkodzenie nerwów czuciowych.

### **Stosowanie u dzieci**

Nie stosować leku u dzieci.

### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-Capsiderm**

Aplikacja zbyt dużej ilości leku Neo-Capsiderm może wywołać podrażnienie skóry.

### **Niewłaściwe użycie**

Jeśli dziecko przypadkowo połknie maść Neo-Capsiderm należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który zaleci niezbędne leczenie. Nie należy wywoływać wymiotów.

## **4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Jak każdy lek, Neo-Capsiderm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W niektórych przypadkach mogą wystąpić odczyny uczuleniowe (wykwit pokrzywkowy).

W przypadku utrzymywania się odczynu uczuleniowego, po zaprzestaniu stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zaprzestać stosowania leku i powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

## **5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEO-CAPSIDERM**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Neo-Capsiderm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. INNE INFORMACJE**

### **Co zawiera lek Neo-Capsiderm**

100 g maści zawiera jako substancje czynne: noniwamid (*Nonivamidum*) - 0,05 g, kamforę (*Camphora*) - 5,3 g, olejek terpentynowy z sosny nadmorskiej (*Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro*) - 9,7 g, olejek eukaliptusowy (*Eucalypti aetheroleum*) - 2,5 g.

Substancje pomocnicze: lanolina, parafina stała, parafina ciekła, wazelina biała.

### **Jak wygląda lek Neo-Capsiderm i co zawiera opakowanie**

Lek Neo-Capsiderm jest w postaci maści.

Dostępne opakowanie zawiera 30 g maści w tubie aluminiowej i w kartoniku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47 - 51, 61-896 Poznań, Polska

tel. + 48 61 886 18 00

fax + 48 61 853 60 58

Data zatwierdzenia ulotki: