

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Delicol

KROPLE
DLA NIEMOWIĄT
15 ml

Na kolkę niemowlęcą

Enzym laktaza

Stosować pod nadzorem lekarza.

Delicol stanowi żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kropli i jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach przejściowych dolegliwości trawiennych spowodowanych nietolerancją laktozy w żywieniu u niemowląt.

Niedobór laktazy może skutkować przejściowymi dolegliwościami trawiennymi spowodowanymi nietolerancją laktozy w żywieniu. Może to być istotny czynnik u dzieci z kolką. **Delicol** rozkłada laktozę zawartą w mleku i sprawia, że staje się ono lepiej przyswajalne. Dzięki temu eliminuje dolegliwości kolkowe.

Cechy kropli **Delicol**:

- duża aktywność enzymu laktazy naturalnego pochodzenia z wyciągu grzyba *Aspergillus oryzae*. *Aspergillus oryzae* to stabilne i biologicznie aktywne źródło laktazy,
- stabilność w pH kwasu żołądkowego.

Delicol może być używany zarówno podczas karmienia piersią, jak również podczas karmienia mlekiem modyfikowanym.

Enzym laktaza umożliwił hydrolizę laktozy z mleka. **Delicol** powinien być używany przy karmieniu niemowląt w okresie pierwszych 3–4 miesięcy życia. Po upływie tego okresu **Delicol** powinien być stopniowo odstawiany.

Sposób użycia: Ilość kropli produktu dodawana do posiłku powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb organizmu. Z tego powodu zaleca się, aby początkowo stosować minimalną ilość kropli określoną w tabeli, a w przypadku braku skuteczności stopniowo zwiększać porcję maksymalnie do górnej wartości z podanych przedziałów. **Wstrząsnąć przed użyciem.**

Karmienie piersią

Stosując się do zaleceń dozowania podanego w tabeli odmierzyć odpowiednią ilość kropli na łyżeczkę. Podaj dziecku do bezpośredniego spożycia. Kontynuuj karmienie piersią.

Mleko modyfikowane Mleko modyfikowane przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. Dodaj krople **Delicol** zgodnie z tabelą dozowania do mleka o temperaturze właściwej do podania. Nie przechowywać niespożytego mleka.

Ilość mleka

60 ml
90 ml
120 ml
150 ml
180 ml
> 180 ml

Ilość kropli na posiłek

6-7 kropli
6-10 kropli
7-14 kropli
10-17 kropli
11-20 kropli
15-25 kropli

Ważne informacje: W trakcie przygotowywania mleka należy zawsze postępować zgodnie ze sposobem użycia. Nie dodawać kropli **Delicol** do mleka, które jest bardzo ciepłe albo bardzo zimne. **Delicol** zawiera enzym laktazę, który ulega zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury. Zaleca się, by krople dodawać do pokarmu w temperaturze pokojowej. Produkt jest niekompletnym środkiem spożywczym. Nie może być stosowany jako jedyne źródło żywienia. Produkt powinien być podawany pod nadzorem lekarza. Produktu nie należy stosować pozajelitowo. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Składniki: Maltoza, woda, sacharoza, maltodekstryna, laktaza, chlorek sodu.

Wartość odżywcza

Wartość energetyczna

tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
laktaza

100 ml

1344,7 kJ (320,7 Kcal)

< 0,1 g
< 0,1 g
78,3 g
55,1 g
1,97 g
0,07 g
1,57 g

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie narażać na działanie promieni słonecznych i ciepła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy używać po okresie przydatności do spożycia. Po otwarciu opakowania preparat powinien być zużyty w ciągu 3 tygodni.

Ilość netto: 15 ml

Produkowane dla Celsis Farmaceutica S.A. przez Labialfarma S.A.

Dystrybutor:

Afiofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Wiek dziecka

Ilość kropli na posiłek

od 0 do 2 tygodni
od 3 do 4 tygodni
od 1 do 2 miesięcy
od 2 do 3 miesięcy
od 3 do 4 miesięcy
> 4 miesięcy

7-8 kropli
8-9 kropli
9-11 kropli
11-14 kropli
12-15 kropli
14-17 kropli