

# Multi-Gyn ActiGel

**Preparat polecany** przy dolegliwościach związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy:

- szare upławy,
- nieprzyjemny zapach,
- świąd,
- podrażnienia i tkliwość,
- zaczerwienienie i bolesność.

## **Właściwości (działanie):**

Multi-Gyn ActiGel oparty jest na opatentowanym kompleksie 2QR. Ta naturalna substancja pochodzenia roślinnego posiada unikalną zdolność blokowania szkodliwych bakterii przed przyczepianiem się do nabłonka pochwy. Szkodliwe bakterie są bezpiecznie neutralizowane. Multi-Gyn ActiGel wspiera również naturalny proces leczenia. Bezpośrednio przywraca optymalną kwasowość pochwy (wartość pH). To delikatnie kwasowe środowisko wspiera rozwój pożytecznych bakterii (pałeczek kwasu mlekowego) optymalizując florę bakteryjną pochwy. Jest to delikatne i wysoce skuteczne leczenie bez znanych szkodliwych działań niepożądanych.

## **Sposób stosowania:**

- W leczeniu bakteryjnego zakażenia pochwy (BV) należy dopochwowo aplikować obfitą ilość preparatu Multi-Gyn ActiGel co najmniej dwa razy dziennie przez okres co najmniej 5 dni. Zaleca się aplikację przed snem.
- W przypadku dolegliwości pochwowych takich jak świąd i podrażnienia należy aplikować obfitą ilość preparatu Multi-Gyn ActiGel co najmniej raz dziennie lub każdorazowo gdy pojawią się objawy.

Preparat Multi-Gyn ActiGel nie powinien być stosowany przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni. Umożliwi to samoregulację flory bakteryjnej pochwy bez dodatkowego wsparcia. Jeśli dolegliwości utrzymują się bądź nawracają, należy skontaktować się z lekarzem.

## **Ostrzeżenia i inne informacje:**

- Alergie na składniki występujące w Multi-Gyn ActiGel są bardzo rzadkie. Jeśli masz jednak wątpliwości, nałóż niewielką ilość żelu na wewnętrzną część przedramienia. Gdy pojawią się swędzące czerwone kropki lub plamy, radzimy powstrzymać się od stosowania Multi-Gyn ActiGel.
- Nie są znane żadne przeciwwskazania do stosowania Multi-Gyn ActiGel w czasie ciąży i karmienia piersią. Porozmawiaj z lekarzem o możliwościach odpowiednich dla ciebie.
- Po zastosowaniu produktu może wystąpić uczucie pieczenia i / lub mrowienia. To doznanie jest normalne i szybko ustępuje.

## **Składniki:**

Multi-Gyn ActiGel jest preparatem naturalnym, opartym na bioaktywnym kompleksie 2QR\*. Preparat nie zawiera substancji zapachowych, hormonów ani składników pochodzenia zwierzęcego.

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer\*, Xanthan Gum, Glycerin, Caprylyl Glycol

\*2QR: opatentowany kompleks bio-aktywnych polisacharydów uzyskiwany z Aloe Barbadensis.

**Opakowanie:** 50ml żel

**Statut preparatu:** Wyrób medyczny klasy IIa

**Producent:** Caro Pharma, Holandia

**Informacji o preparacie udziela:** Qpharma Sp. z o.o., ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa, tel. (022) 590 57 00, fax (022) 590 57 01, qpharma@qpharma.pl, www.qpharma.pl