

Wskazówki dotyczące stosowania

Lakripos® Gel

Żel do nawilżania i odświeżania oczu

10 g jałowego żelu do oczu

Carbomer 980 - 2 mg/g



Czym jest Lakripos® Gel

Lakripos® Gel jest jałowym żelem do oczu, zawierającym Carbomer 980 - 2 mg/g, cetrymid, sorbitol, wodorotlenek sodu, wersenian sodu i wodę do wstrzykiwania.

W jakim celu stosuje się Lakripos® Gel

Lakripos® Gel odświeża i łagodzi podrażnienia oczu, nawilża ich powierzchnię w przypadku uczucia suchości lub pieczenia.

Przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, intensywna praca przed monitorem komputera są jedynie dwiema ewentualnymi przyczynami suchości oczu. Powieki są rzadziej zamykane, tży szybciej odparowują, powierzchnia oka jest niedostatecznie nawilżana. Oczy zaczynają swędzić, piec, męczą się, są zaczerwienione i podrażnione.

Lakripos® Gel jest krystalicznie przejrzystym żelem. Po zakropleniu i kilkakrotnym mrugnięciu powiekami, na powierzchni oka tworzy się równomierna i trwała warstwa chroniąca oko przed podrażnieniem i suchością. Objawy są łagodzone natychmiast, przywracane jest odczucie świeżości oczu, utrzymujące się przez długi czas.

Jak należy stosować Lakripos® Gel

Należy zakraplać preparat unikając kontaktu końcówki tubki z gałką oczną lub ze skórą. Zdjąć nakrętkę ochronną, odchylić głowę do tyłu, odciągnąć dolną powiekę oka palcem wskazującym, trzymając drugą ręką tubkę w pozycji pionowej nad okiem podać jedną kroplę żelu do worka spojówkowego. Następnie ostrożnie zamknąć powieki. Należy zakraplać żel do oka przez delikatne naciskanie tubki, nie powodując jej zginania lub zwijania. Po użyciu żelu założyć nakrętkę ochronną na tubkę.

Jakich innych wskázówek stosowania należy przestrzegać

Nie należy stosować preparatu Lakripos® Gel równocześnie z innymi lekami okulistycznymi. W przypadku konieczności użycia innych preparatów okulistycznych w postaci kropli do oczu, należy odczekać około 15 minut przed nałożeniem Lakripos® Gel. Nie należy stosować maści do oczu wcześniej niż po upływie 1 godziny od zakropleniu Lakripos® Gel.

Przejściowa nieostrość widzenia może występować przez kilka minut po podaniu preparatu. W tym czasie prosimy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn lub wykonywania prac bez stabilnego oparcia dla stóp.

Jak często i jak długo należy stosować Lakripos® Gel

Dawkowanie preparatu Lakripos® Gel należy ustalić indywidualnie, odpowiednio do dolegliwości pacjenta i zaleceń okulisty. Zazwyczaj wkrapla się do oka jedną kroplę Lakripos® Gel 3-5 razy dziennie. W przypadku odczuwania potrzeby częstszego stosowania Lakripos® Gel, prosimy skonsultować się z lekarzem okulistą. Podobnie jak w przypadku

innych dolegliwości, należy skonsultować się z lekarzem, gdyby dolegliwości nie ustępowały, aby mógł on podjąć decyzję dotyczącą dawkowania i czasu trwania terapii.

Kiedy nie należy stosować preparatu Lakripos® Gel

Preparatu Lakripos® Gel nie powinni stosować pacjenci uczuleni na cetrymid lub którykolwiek inny składnik preparatu.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie lub pieczenie. Należy wówczas zaprzestać stosowania preparatu Lakripos® Gel i skonsultować się z okulistą.

Nie stosować Lakripos® Gel na soczewki kontaktowe. Przed podaniem preparatu należy zdjąć soczewki, zakropić preparat, po odczekaniu 15 minut ponownie założyć soczewki.

Jakich wskazań dotyczących przechowywania Lakripos® Gel należy przestrzegać

Lakripos® Gel należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Nie używać Lakripos® Gel po upływie terminu ważności wydrukowanym na opakowaniu i tubce.

Przy przestrzeganiu powyższych zaleceń, Lakripos® Gel może być stosowany przez cztery tygodnie po otwarciu tuby.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Data opracowania ulotki:

Luty 2010

Wytwórca ():

URSAPHARM

Industriestraße

66129 Saarbrücken

Niemcy

CE 0197 