



ALECTOIN

Instrukcja użytkowania

Przed zastosowaniem kropli ALECTOIN prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę, gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących używania preparatu należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub dystrybutorem.

1. Co to jest ALECTOIN i jakie ma zastosowanie

Krople do oczu ALECTOIN są wyrobem medycznym zawierającym ektoinę (Ectoin®), występującą w przyrodzie naturalną cząsteczkę chroniącą komórki przed oddziaływaniem szkodliwych czynników, łagodzącą stany zapalne i stabilizującą błony komórkowe. Krople do oczu ALECTOIN to izotoniczny roztwór przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów alergicznego zapalenia spojówek.

Krople skutecznie łagodzą zaczerwienienie, swędzenie i łzawienie oczu towarzyszące alergicznemu zapaleniu spojówek. Chronią oczy przed szkodliwym wpływem alergenów, przyspieszając proces regeneracji podrażnionej i nadwrażliwej spojówki. Krople mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe, dzieci oraz osoby z nadwrażliwością oczu. Krople do oczu ALECTOIN nie zawierają środków konserwujących.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kropli do oczu ALECTOIN nie należy stosować po operacji lub urazie w obrębie oczu.

Kropli do oczu ALECTOIN nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę lub na inne składniki kropli do oczu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy niezwłocznie przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Ze względów higienicznych zaleca się, aby produkt stosowany był tylko przez jednego użytkownika. Produkt należy użyć w ciągu 6 tygodni od otwarcia.

3. O czym trzeba wiedzieć przed użyciem kropli ALECTOIN

Nie stwierdzono żadnych interakcji kropli do oczu z ektoiną ALECTOIN z innymi kroplami lub stosowanymi miejscowo maściami do oczu. Pomiędzy zastosowaniem dawki ALECTOIN i innego wyrobu medycznego lub leku do oczu należy zachować przynajmniej 15-minutowy odstęp czasu.

4. Stosowanie preparatu w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią

Brak jest danych dotyczących stosowania kropli ALECTOIN w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią.

W przypadku ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

5. Sposób użycia

ALECTOIN należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zakraplać 1-2 krople do każdego oka kilka razy dziennie. Dzieci w wieku do 10 lat nie powinny zakraplać kropli samodzielnie.

1. Zdjąć osłonkę zabezpieczającą końcówkę zakraplacza, uważając aby nie dotknąć końcówki zakraplacza.
2. Palec wskazujący i środkowy położyć na okrągłej płytce na czubku buteleczki, kciuk przykładając do jej spodu.
3. Przed pierwszym użyciem należy odwrócić butelkę zakraplaczem w dół i nacisnąć kciukiem na spód butelki (ok. 2-3 razy) do momentu spełnienia pierwszych kropli. Nie odcinać końcówki zakraplacza.
4. Odchylić głowę, palcem wskazującym odciągnąć dolną powiekę w dół i patrząc w górę zakropić preparat do oka trzymając butelkę zakraplaczem w dół i naciskając okrągłą płytkę na butelce. Unikać bezpośredniego kontaktu końcówki zakraplacza z palcami, oczami lub soczewkami kontaktowymi. Dzięki opatentowanemu mechanizmowi z pompką, z buteleczki wypłynie tylko jedna kropla.
5. Zamknąć powoli oko tak, aby preparat równomiernie rozprowadził się na soczewce oka.
6. W ten sam sposób zakropić preparat do drugiego oka.
7. Po każdym zastosowaniu należy osuszyć końcówkę zakraplacza i zamknąć ją osłonką zabezpieczającą.

6. Możliwe skutki uboczne

ALECTOIN dzięki odpowiednio skomponowanemu składowi i optymalnej wartości pH jest dobrze tolerowanym preparatem - nie są znane występujące regularnie lub utrzymujące się działania niepożądane. W pojedynczych przypadkach krople mogą powodować krótkotrwałe podrażnienie oka, przekrwienie gałki ocznej albo zapalenie spojówki. W razie zaobserwowania wystąpienia skutków ubocznych podczas stosowania kropli ALECTOIN należy zgłosić je lekarzowi, farmaceucie albo dystrybutorowi preparatu.

7. Informacje dodatkowe i przechowywanie

Termin ważności umieszczony jest na pudełku oraz buteleczce z kroplami.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Należy przechowywać w temperaturze 2-25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



8. Postać preparatu

Preparat dostępny jest w postaci kropli o pojemności 10 ml

Skład:

Ectoin®, hydroksyetyloceluloza, chlorek sodu, woda, bufor cytrynianowy

Wytwórca:

 bitop AG 

Stockumer Str. 28,

58453 Witten, Niemcy

Dystrybutor:



Solinea Sp. z o.o. Sp. K.

Elizówka 65, Hala I


21-003 Ciecierzyn, Polska

Infolinia: 0801703312

Stan informacji: 01.2016

Objaśnienie symboli:

12386/70681/TD160V5


 Wyrób medyczny z numerem jednostki notyfikowanej

 Wytwórca

 Należy postępować zgodnie z instrukcją

 25°C
2°C Temperatura przechowywania

 Termin ważności

 Zachować ostrożność, zapoznać się z instrukcją (ostrzeżenia / środki ostrożności)

 Wyrób sterylny, przetwarzany aseptycznie

 Numer partii