

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULGIX WZDĘCIA

80 mg, kapsułki miękkie
(*Simeticonum*)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Ulgix Wzdęcia ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Ulgix Wzdęcia i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ulgix Wzdęcia
3. Jak stosować lek Ulgix Wzdęcia
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ulgix Wzdęcia
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ULGIX WZDĘCIA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Symetykon jest lekiem stosowanym przeciw wzdęciom i nadmiernemu gromadzeniu się gazów. Działa w żołądku i jelitach poprzez zmianę napięcia powierzchniowego na granicy faz między płynną zawartością przewodu pokarmowego i pęcherzykami gazu. Ułatwia to zlewanie się pęcherzyków gazowych nagromadzonych w treści pokarmowej i w ślinie, a następnie ich przechodzenie przez jelito. Gazy usuwane są z przewodu pokarmowego drogą odbijania, oddawania wiatrów lub wzrostu wchłaniania gazu do krwi. Ze względu na właściwości odpieniające symetykon stosowany jest pomocniczo w celu usunięcia gazów przed badaniami diagnostycznymi: ultrasonografią, radiografią i endoskopią jamy brzusznej.

Ulgix Wzdęcia jest stosowany w:

- objawowym leczeniu dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w jelitach i uczuciem pełności w jamie brzusznej,
- pomocniczo przed badaniami diagnostycznymi: ultrasonografią, radiografią i endoskopią jamy brzusznej w celu usunięcia nadmiaru gazów przed badaniami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ULGIX WZDĘCIA

Kiedy nie stosować leku Ulgix Wzdęcia

- jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie zaobserwowano interakcji symetykonu z innymi lekami.

Stosowanie leku Ulgix Wzdęcia z jedzeniem i pićciem

Lek należy podawać po posiłku.

W dniu badania diagnostycznego lek należy stosować na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Lek uważany jest za bezpieczny i nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ulgix Wzdęcia

Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej lek może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ULGIX WZDĘCIA

Ulgix Wzdęcia należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli 1 kapsułka (80 mg) 4 razy w ciągu doby.

Przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej: na 1 dzień przed planowanym badaniem diagnostycznym 1 kapsułka (80 mg) 3 razy na dobę, a w dniu badania jedna kapsułka rano na czczo.

Lek należy podawać po posiłkach i przed snem.

Nie przekraczać dawki 6 kapsułek na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ulgix Wzdęcia

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Ulgix Wzdęcia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ulgix Wzdęcia może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie zaobserwowano działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych niewymienionych w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ULGIX WZDĘCIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ulgix Wzdęcia po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek **Ulgix Wzdęcia**

Substancją czynną leku jest symetykon.

Ponadto lek zawiera: żelatynę, glicerol, żółcień chinolinową E104.

Jak wygląda lek **Ulgix Wzdęcia** i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie leku zawiera 25, 50 lub 100 kapsułek umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Dział Informacji o Leku

tel. + 48 (022) 742 00 22

e-mail informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

2010 -12- 22

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji

00-952 Warszawa

ul. Miodowa 15