

## Treść oznakowania instrukcji używania

### Iladian direct plus

#### 10 tabletek dopochwowych

- Ogranicza rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych,
- Redukuje świąd, upławy i nieprzyjemny zapach,
- Odtwarza i utrzymuje fizjologiczne pH,
- Likwiduje napięcie i suchość błony śluzowej pochwy.

Bakteryjne zakażenie pochwy jest zaburzeniem równowagi pomiędzy poszczególnymi rodzajami bakterii występujących w środowisku pochwy. W jego przebiegu znacząco wzrasta liczba bakterii beztlenowych powodujących dokuczliwe objawy, spada natomiast ilość korzystnych pałeczek kwasu mlekowego należących do rodzaju *Lactobacillus*, które zapewniają utrzymanie fizjologicznego kwaśnego odczynu pochwy (pH<4,5). Zmniejszenie ilości bakterii kwasu mlekowego może także prowadzić do rozwoju drożdżaków (najczęściej z gatunku *Candida albicans*) wywołujących grzybicze zapalenie pochwy.

Wyrób medyczny Iladian direct plus poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH pochwy stwarza warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju *Candida*. Dodatkowo zawarta w wyrobie inulina korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pełni istotną rolę w zapobieganiu namnażaniu się bakterii wywołujących infekcje w układzie moczowo - płciowym. Działanie Iladian direct plus zostało uzupełnione obecnością kwasu hialuronowego i witaminy E, które nawilżają błonę śluzową pochwy łagodząc świąd, suchość i uczucie napięcia oraz zmniejszając podatność na mikrourazy.

Iladian direct plus zalecany jest:

- pomocniczo w leczeniu bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy,
- w łagodzeniu dolegliwości takich jak suchość i uczucie napięcia błony śluzowej pochwy,
- w trakcie i po zakończeniu stosowania doustnych antybiotyków i preparatów przeciwbakteryjnych,
- w okresie okołomenopauzalnym (klimakterium),
- kobietom uczęszczającym na basen, często podróżującym, korzystającym z jacuzzi, sauny i solarium.

#### Sposób postępowania z wyrobem

##### ***Tylko do stosowania dopochwowego.***

Przed aplikacją dokładnie umyć dłonie.

Wspomaganie leczenia infekcji pochwy: Stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni.

Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Iladian direct plus może być stosowany profilaktycznie.

Profilaktyka: Stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania Iladian direct plus lub będą się utrzymywać powyżej 7-10 dni.

### **Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności**

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe. W przypadku występowania upławów z krwią nie stosować wyrobu Iladian direct plus i skonsultować się z lekarzem. Wyrób medyczny Iladian direct plus nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi preparatami do stosowania dopochwowego. Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

### **Skład:**

kwask L-askorbinowy, inulina, witamina E, kwas hialuronowy.

Pozostałe składniki: laktoza, stearynian magnezu.


### **Możliwe działania niepożądane**

W rzadkich przypadkach może wystąpić uczucie pieczenia pochwy.

### **Miejsce i warunki przechowywania**


#### ***Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.***


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić od światła i wilgoci.



Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

Data wydania instrukcji używania: 03/2017



 Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,  
ul. Partyzancka 133/151  
95-200 Pabianice