

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Sonol

płyn do stosowania na skórę

Sonol, (21 mg + 21 mg + 2 mg) / 1 ml, płyn na skórę Levomentholum + Acidum salicylicum + Thymolum

1 ml preparatu zawiera:

Substancje czynne

Lewomentol (<i>Levomentholum</i>)	21 mg
Kwas salicylowy (<i>Acidum salicylicum</i>)	21 mg
Tymol (<i>Thymolum</i>)	2 mg

Substancja pomocnicza

Glikol propylenowy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sonol i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sonol
3. Jak stosować lek Sonol
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Sonol
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SONOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Jest to lek złożony w formie płynu do stosowania na skórę, stosowany zewnętrznie jako środek pomocniczy w leczeniu chorób zakaźnych skóry. Substancjami czynnymi są: kwas salicylowy w ilości 21 mg/1ml, tymol w ilości 2 mg/1ml oraz mentol w ilości 21 mg/1ml.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SONOL

Kiedy nie stosować leku Sonol

Nie zaleca się stosowania produktu na otwarte rany, błony śluzowe i skórę uszkodzoną, przy nadwrażliwości na składniki preparatu. Nie wolno stosować u noworodków i dzieci do 12 lat życia. Nie stosować w przypadku rozległych zmian złuszczących (np. w łuszczycy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sonol

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu (utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Sonol z innymi lekami

Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi składniki złuszczące np. rezorcynę, siarkę ponieważ może nastąpić podrażnienie skóry.

Ciąża i karmienie piersią

Produktu Sonol nie wolno stosować w okresie ciąży i karmienia, bez konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sonol

Ponieważ kwas salicylowy bardzo łatwo wchłania się w przez skórę nie powinien być stosowany na dużych obszarach skóry przez długi czas, szczególnie u dzieci.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SONOL

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia

Zewnętrznie

Miejsca swędzące i wykwity na wargach smarować cienko i równomiernie początkowo 4-5 razy na dobę, gdy nastąpi poprawa 2-3 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sonol

Nie występuje.

Pominięcie zastosowania leku Sonol:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Sonol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podrażnienie skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SONOL

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w temperaturze poniżej 25 °C, chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Sonol po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Sonol

Substancjami czynnymi leku są mentol, kwas salicylowy, tymol (21 mg + 21 mg + 2 mg)/ 1 ml

Substancją pomocniczą leku jest: glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Sonol i co zawiera opakowanie

Lek jest w postaci płynu, umieszczony jest w butelce (HDPE) zakończonej zamknięciem typu rollon i zakrętką (PP) oraz obejmą z kulką (LDPE,PP).

Sonol jest dostępny w opakowaniu zawierającym 8 g preparatu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych B. Kazub, A. Orłowski Sp. J

97-340 Rozprza ul. Sportowa 9

TEL:(0-44) 6158253(4)

FAX: (0-44) 6158253(4)

E-MAIL: elanda@elanda.pl

Data zatwierdzenia ulotki

{ MM/RRRR }