

Oznakowanie opakowania bezpośredniego – 125 g butelka szklana

Syrop Prawoślazowy

(*Sirupus Althaeae*)

125 g

Skład:

100 g produktu zawiera:

macerat z 5 g korzenia prawoślazu	35,9 g
sacharoza	64,0 g
kwask benzoesowy	0,1g

Działanie: Syrop prawoślazowy osłania błonę śluzową jamy ustnej i gardła chroniąc je przed podrażnieniem.

Wskazania do stosowania: Suchy kaszel, podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość (uczulenie) na składniki produktu. Uczulenie na kwas benzoesowy.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Lek zawiera sacharozę. 5 ml syropu zawiera 4,2 g sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu) mniej niż 100 mg na dawkę.

Nie należy stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Jeżeli wystąpi duszność, gorączka i ropna wydzielina należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Interakcje: Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak danych, przed zastosowaniem syropu należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Brak danych.

Sposób stosowania i droga podania:

Lek należy stosować doustnie. Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dzieci od 3 do 6 roku życia: 2,5 ml - 5 ml 3 razy dziennie

Dzieci od 6 do 12 roku życia: 5 ml - 10 ml 3-4 razy dziennie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 10 ml – 15 ml 3-4 razy dziennie.

Maksymalna dawka dobową do 5 razy dziennie.

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 1 tydzień należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane: Nieznane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Te. (42) 22-53-100

Wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Krzywa 2
95-030 Rzgów

Nr serii:

Pozwolenie nr: 12180

Kod kreskowy EAN UCC: 5909990573578

Informacja podana systemem Braille'a: Syrop prawoślazowy