

**Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta**

VAGICAL  
Globulki

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

**Spis treści ulotki**

1. Co to jest lek Vagical i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vagical
3. Jak stosować lek Vagical
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Vagical
6. Zawartość opakowania i inne informacje

**1. Co to jest lek Vagical i w jakim celu się go stosuje**

Vagical jest lekiem homeopatycznym wskazanym w stanach zapalnych dróg rodnych objawiających się upławami, świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem okolicy warg sromowych.

**2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vagical**

**Kiedy nie stosować leku Vagical**

W nadwrażliwości (uczuleniu) na którykolwiek ze składników leku. W nadwrażliwości na rośliny z rodziny astrowatych *Asteraceae* (wcześniej złożonych *Compositae*) np. rumianek, jeżówka, arnika.

**Dzieci i młodzież**

Nie stosować u dziewczynek poniżej 12 roku życia. Stosowanie u osób w wieku 12-18 lat po konsultacji z lekarzem.

**Lek Vagical a inne leki**

Lek Vagical może być stosowany z innymi lekami.

## Ulotka dla pacjenta

### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### **3. Jak stosować lek Vagical**

Lek przeznaczony jest do podawania dopochwowego. Dorosłe kobiety: 1 globulka 2-3 razy dziennie. Przed zastosowaniem globulkę należy zwilżyć przegotowaną, ostudzoną wodą. Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią po 3-4 dniach stosowania, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

### **4. Możliwe działania niepożądane**

Podczas stosowania leku mogą wystąpić objawy nadwrażliwości przejawiające się podrażnieniem błony śluzowej pochwy i sromu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [aktualny adres, nr telefonu i faksu, adres e-mail].

### **5. Jak przechowywać lek Vagical**

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

### **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

#### **Co zawiera lek Vagical**

Substancją czynną leku jest nalewka macierzysta z nagietka lekarskiego (*Calendula officinalis TM*) 150 mg/globulkę.

Substancja pomocnicza to glikol polioksyetylenowy.

#### **Jak wygląda lek Vagical i co zawiera opakowanie**

Opakowanie zawiera 10 globulek w folii PVC/PE, w pudełku tekturowym z ulotką.

#### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30- 721 Kraków

**Data ostatniej aktualizacji ulotki:** 2014 -07- 1 0