

SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
MERYTORYCZNYM

## ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

2011 -04- 12

**MAŚĆ NA ODCISKI**  
(*Acidum salicylicum* + *Acidum lacticum*)  
(400 mg + 100 mg)/g, maść

M30

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Maść na odciski ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Maść na odciski i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść na odciski
3. Jak stosować lek Maść na odciski
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Maść na odciski
6. Inne informacje

### 1. CO TO LEK MAŚĆ NA ODCISKI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Maść na odciski zawiera substancje czynne kwas salicylowy i kwas S-mlekowy oraz substancje pomocnicze - plaster nostrykowy i lanolinę.

Lek po zastosowaniu na odcisk działa keratolitycznie (złuszczająco), zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie oraz działa miejscowo przeciwzapalnie.

### 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MAŚĆ NA ODCISKI

#### Kiedy nie stosować leku Maść na odciski

- jeśli występuje nadwrażliwość na kwas salicylowy, mlekowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona zapalnie,
- u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami krążenia,
- u dzieci.

#### Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Maść na odciski

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk. Nie należy stosować leku na niezmienną zdrową skórę, ani na skórę uszkodzoną, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Unikać kontaktu maści z oczami i błonami śluzowymi.

#### Stosowanie innych leków

Nie są znane interakcje wynikające z miejscowego i krótkotrwałego zastosowania leku zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i kobiet karmiących piersią.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

## **3. JAK STOSOWAĆ LEK MAŚĆ NA ODCISKI**

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na odciski.

Odcisk wymoczyć i osuszyć. Nałożyć na odcisk cienką warstwę maści i zabezpieczyć plastrem lub bandażem. Stosować lek przez 4 do 6 dni rano i na noc, nie zmywając posmarowanych miejsc wodą. Następnie odcisk należy dobrze wymoczyć w gorącej wodzie i usunąć. Nie należy wycinać ani wyrzywać odcisków. W razie braku efektów, powtórzyć leczenie po upływie 3 dni.

### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść na odciski**

Przedawkowanie leku, zastosowanie na skórę wrażliwą lub uszkodzoną bądź nałożenie na błony śluzowe, mogą doprowadzić do miejscowego uszkodzenia tkanek. W razie przypadkowego spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem.

### **Pominięcie zastosowania leku Maść na odciski**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Jak każdy lek, lek Maść na odciski może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie leku zgodnie ze wskazaniami i zalecany dawkowaniem nie wiąże się z istotnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.

Niekiedy może wystąpić miejscowe podrażnienie i objawy nadwrażliwości skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce.

## **5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MAŚĆ NA ODCISKI**

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Maść na odciski po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. INNE INFORMACJE**

### **Co zawiera lek Maść na odciski**

Substancjami czynnymi leku są: kwas salicylowy, kwas (S)-mlekowy.

1 g maści zawiera 400 mg kwasu salicylowego i 100 mg kwasu (S)-mlekowego.  
Ponadto lek zawiera plaster nostrykowy, lanolinę.

**Jak wygląda lek Maść na odciski i co zawiera opakowanie**

Lek ma postać maści.

Opakowanie leku to tuba zawierająca 10 g maści.

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel.: (71) 352 95 22

faks: (71) 352 76 36

Informacja o Leku

tel. (22) 742 00 22

e-mail: [informacjaoleku@hasco-lek.pl](mailto:informacjaoleku@hasco-lek.pl)

**Data zatwierdzenia ulotki: 2011 -05- 11**