

OROFAR[®] MAX

2 mg + 1 mg, pastylki twarde

Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Orofar MAX ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustępują w ciągu 5 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasiliły się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Orofar MAX i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orofar MAX
3. Jak stosować Orofar MAX
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Orofar MAX
6. Inne informacje

1. CO TO JEST OROFAR MAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Orofar MAX ma postać pastylek do ssania. Stosowany jest w miejscowym leczeniu antyseptycznym stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzeniu dolegliwości bólowych w tych stanach

Orofar MAX zawiera dwie substancje czynne:

- chlorek cetylpyrydyniowy – substancję o właściwościach antyseptycznych (odkażających) działającą bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo.
- chlorowodorek lidokainy - substancję o właściwościach znieczulających, łagodzących ból.

Zawarte w leku olejki miętowe i lewomentol nadają pastylkom miętowy smak.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OROFAR MAX

Kiedy nie stosować leku Orofar MAX

- jeśli stwierdzone jest uczulenie (nadwrażliwość) na cetylpyrydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Orofar MAX.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Orofar MAX

- Jeżeli stan zapalny gardła i gorączka utrzymują się przez kilka dni, przed zastosowaniem leku OROFAR MAX należy zwrócić się po poradę do lekarza.
- Jeżeli ból gardła jest połączony z gorączką, zawrotami głowy, nudnościami lub wymiotami, przed

zastosowaniem leku Orofar MAX należy zwrócić się po poradę do lekarza.

- Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 5 dni stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
- Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.

Stosowanie leku Orofar MAX u dzieci:

Leku OROFAR MAX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Stosowanie leku Orofar MAX z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Orofar MAX z jedzeniem i piciem

Nie należy stosować leku Orofar MAX podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek Orofar MAX może być stosowany przez kobiety w ciąży jedynie na zlecenie lekarza.

Leku OROFAR MAX nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Orofar Max nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, jeżeli jest stosowany w zalecanych dawkach.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Orofar MAX

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej nie-tolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OROFAR MAX

Pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej.

Nie należy jej żuć ani połykać.

Leku OROFAR MAX nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu.

Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu.

Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Nie należy stosować leku Orofar MAX u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orofar MAX

W przypadku zastosowania większej od zalecanej liczby pastylek leku Orofar MAX należy niezwłocznie skonsultować się lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Orofar MAX

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Orofar MAX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Rzadko może wystąpić przemijające podrażnienie jamy ustnej i gardła, mogą także wystąpić nudności i wymioty.
- W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna. Należy wówczas przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ Orofar MAX

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Orofar MAX po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Orofar MAX

- Substancjami czynnymi leku są cetylopirydyniowy chlorek i lidokainy chlorowodorek. Jedna pastylka Orofar MAX zawiera: 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodorku.
- Inne składniki leku to olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejki miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian, sorbitol.

Jak wygląda Orofar MAX i co zawiera opakowanie

Lek Orofar MAX jest dostępny w postaci pastylek o smaku miętowym.

Dostępne opakowania: 10, 20 lub 30 pastylek twardych

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Novartis Consumer Health GmbH
Zielstattstrasse 40
81379 Monachium, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Novartis Consumer Health
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel. (0-22) 375 75 75

Data zatwierdzenia ulotki:

24.05.2010

PL 906846 – 1803855

 **NOVARTIS**