

## ULOTKA DLA PACJENTA

*Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Altazija ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.*

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.*
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.*
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.*

### ALTAZIAJA

Aluminii acetotartras

10 mg/g, żel

1 g żelu zawiera:

- substancję czynną: 10 mg octanowinianu glinu,
- substancje pomocnicze: mentol, etylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, karbomer, trietanolamina, woda oczyszczona.

Dostępne opakowanie:

Tuba aluminiowa, laminowana z membraną, zawierająca 40 g lub 75 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny:

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

ul. Jesienna 9

80-298 Gdańsk

Wytwórca:

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

Zakład Nr 2

ul. Przemysłowa 12

83-050 Kolbudy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Altazija i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Altazija
3. Jak stosować lek Altazija
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Altazija
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Altazija

### **1. Co to jest lek Altazija i w jakim celu się go stosuje**

Lek Altazija ma postać żelu, jest przeznaczony do stosowania na skórę. Substancją czynną leku Altazija jest octanowinian glinu o działaniu ściągającym i przeciwobrzękowym.

Lek łagodzi ból w obrębie ogniska zapalnego, ponadto dzięki zawartości mentolu ma działanie ochładzające.

### **Wskazania do stosowania:**

Lek jest wskazany do stosowania miejscowego w:

- stłuczeniach,
- obrzękach stawowych,
- obrzękach pourazowych,
- obrzękach po oparzeniach I stopnia.

## **2. Zanim zastosuje się lek Altaziaja**

### **Nie należy stosować leku Altaziaja:**

- w nadwrażliwości na octanowinian glinu lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku,
- na otwarte, rozległe rany,
- na zakażoną skórę,
- na zmienioną chorobowo skórę,
- u dzieci do 3 lat.

### **Zachować szczególną ostrożność stosując Altaziaja:**

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, należy usunąć lek, spłukując go obficie wodą.

### **Ciąża i karmienie piersią:**

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

### **Ważne informacje o niektórych składnikach leku Altaziaja:**

Lek Altaziaja może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego), ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu etylu i parahydroksybenzoesanu propylu.

### **Stosowanie innych leków:**

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

## **3. Jak stosować lek Altaziaja**

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, na bolące miejsca nanieść niewielką ilość żelu 3 do 4 razy na dobę, najlepiej w postaci okładów.

### **Dzieci:**

Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

### **W przypadku zastosowania większej dawki leku Altaziaja niż zalecana:**

Dotychczas nie opisano przypadku przedawkowania miejscowo stosowanego żelu z octanowinianem glinu, podczas stosowania zgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania.

### **W przypadku omyłkowego spożycia leku Altaziaja:**

W przypadku omyłkowego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek Altaziaja może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne. Intensywne stosowanie żelu może spowodować macerację skóry. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić odczyny: rumieniowe, grudkowe, ziarninowe. Podczas stosowania żelu przez pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperalbuminemii (zwiększone stężenie glinu we krwi) i hipofosfatemii (zmniejszone stężenie fosforanów we krwi).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Altaziaja mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia tych i innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

### **5. Przechowywanie leku Altazija**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Altazija po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

### **6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Altazija**

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

ul. Jesienna 9

80-298 Gdańsk

tel. (058) 521 34 00, (058) 341 38 52

Data opracowania ulotki: 21.10.2009

ZIAJA Ltd  
Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.  
80-298 Gdańsk-Matarnia, ul. Jesienna 9  
tel. (058) 5213400, fax (058) 5213500  
XIII

V-CE PREZES ZARZĄDU

*B. Ziaja*  
mgr Bartosz Ziaja