

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry efekt leczenia, należy stosować lek Dentosept A ostrożnie i zgodnie z informacją zawartą w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy choroby nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

Dentosept A

płyn do stosowania w jamie ustnej

25 g

Skład: 100 g produktu zawiera wyciąg płynny złożony (0,65:1) z: koszyczka rumianku, kory dębu, liści szalwii, ziela arniki, kłącza tataraku, ziela mięty pieprzowej, ziela tymianku (2/2/2/1/1/1/1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V) – 50,0 g, benzokaina – 2,0 g. Zawartość etanolu: 35 – 45% (v/v).

Dostępne opakowania: 25 g płynu w butelce szklanej.

Podmiot odpowiedzialny:

PhytoPharm Klęka SA

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Dentosept A i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Dentosept A
3. Jak stosować lek Dentosept A
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Dentosept A
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Dentosept A

1. Co to jest lek Dentosept A i w jakim celu się go stosuje

W skład leku Dentosept A wchodzi wyciąg etanolowy złożony z koszyczka rumianku, kory dębu, liści szalwii, ziela arniki, kłącza tataraku, ziela mięty pieprzowej, ziela tymianku oraz benzokaina. Lek stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu znieczulającym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i odkażającym. Produkt przeznaczony do stosowania tradycyjnego w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Lek tradycyjnie stosowany w:

- stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł,
- aftach,
- odleżynach w jamie ustnej (po protezach zębowych),
- pomocniczo w parodontozie.

2. Zanim zastosuje się lek Dentosept A

Nie należy stosować leku Dentosept A u osób z nadwrażliwością na benzokainę, arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny *Asteraceae* (*Compositae*).

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Dentosept A, ponieważ dawka jednorazowa leku (1 ml) zawiera około 0,4 g etanolu. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Zawartość etanolu w leku należy wziąć pod uwagę stosując preparat u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci.

Stosowanie leku Dentosept A u dzieci

Ze względu na zawartość benzokainy i etanolu nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12. roku życia, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania. Decyzję o użyciu leku może podjąć lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn będących w ruchu. Bezpośrednio po zastosowaniu Dentosept A alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, dlatego nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu leku. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

Stosowanie innych leków

Interakcje z innymi lekami nie są znane. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Dentosept A

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, smarować miejsca zmienione chorobowo w jamie ustnej za pomocą patyczka higienicznego do 3. razy dziennie. Bezpośrednio po zastosowaniu leku nie płukać jamy ustnej.

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują w ciągu kilku dni należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Dentosept A jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku zażycia znacznie większej dawki leku Dentosept A

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku **Dentosept A**.

W przypadku pominięcia dawki leku Dentosept A należy kontynuować zalecane dawkowanie.

4. Możliwe działania niepożądane

Przebarwienia zębów i śluzówki jamy ustnej przemijające po umyciu zębów. Przemijające jest również krótkotrwałe pieczenie błony śluzowej występujące bezpośrednio po zastosowaniu leku. Reakcje nadwrażliwości u osób uczulonych na benzokainę, methemoglobinemia.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Dentosept A po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

PhytoPharm Klęka SA
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polska

Data ostatniej weryfikacji ulotki: