

{Torebka papierowa powlekana PE}

POTASU NADMANGANIAN
Proszek do sporządzania roztworu
(Kalii permanganas, FP)

Potasu nadmanganian (*Kalii permanganas*) 5,0 g

Kod kreskowy EAN UCC 5909994126015

Do płukania jamy ustnej i gardła: w szklance wody dokładnie rozpuścić nie więcej niż kilka kryształków substancji (roztwór lekko różowy). Nie połykać roztworu.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Silny utleniacz. Przechowywać z dala od substancji łatwopalnych. Chronić oczy. W razie przypadkowego wypicia roztworu potasu nadmanganianu lub spożycia substancji niezwłocznie wypić mleko. Bezpośredni kontakt substancji może spowodować uszkodzenie skóry, błon śluzowych oraz ubrania.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Logo podmiotu odpowiedzialnego

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL – 1260/ChF

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

Działanie

Środek o działaniu antyseptycznym i utleniającym.

Wskazania do stosowania

Przygotowane roztwory wodne stosować zewnętrznie: do przemywania skóry, ropiejących ran i owrzodzeń lub do płukania jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania

Brak danych.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

Nie stosować równocześnie lub bezpośrednio po zastosowaniu innych leków lub kosmetyków, ze względu na silne działanie utleniające i możliwe interakcje.

Ciąża lub laktacja

W okresie ciąży i karmienia piersią nie stosować do płukania gardła, nie ma przeciwwskazań do stosowania na skórę.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Potasu nadmanganian może powodować działania niepożądane.

Po zastosowaniu może wystąpić brązowe zabarwienie skóry, które można usunąć słabym roztworem kwasu szczawowego.

Nie stosować u osób nadwrażliwych na potasu nadmanganian.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie

Wielokrotne i częste stosowanie w stężeniu wyższym niż zalecane może spowodować podrażnienia (zaczerwienienie, wysuszenie skóry).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Informacja podana systemem Braille'a: potasu nadmanganian