

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (75 g)
(pojemnik z polipropylenu z wieczkiem z polietylenu)

GLUKOZA (Glucosum anhydricum)

Proszek do sporządzania roztworu doustnego, proszek doustny

Zawartość opakowania

75 g

Wskazania do stosowania

Stany niedoboru węglowodanów, stany wyczerpania, np. po długotrwałym wysiłku fizycznym.

Stany hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą (np. przy przedawkowaniu insuliny). Według wskazań lekarskich, w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy.

Sposób stosowania i droga podania

Doustnie doraźnie. W stanach wyczerpania, po wysiłku, można przyjąć łyżeczkę do kilku łyżeczek glukozy (5 g – 20 g).

Doustny test tolerancji glukozy: Po wykonaniu oznaczenia glukozy we krwi na czczo, 75 g glukozy rozpuścić w szklance wody (200 – 300 ml), roztwór wypić w ciągu 3-5 min. Następne oznaczenie glukozy wykonuje się po 120 minutach.

Przeciwwskazania

Zespół złego wchłaniania glukozy lub galaktozy.

Specjalne ostrzeżenia

W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie według zaleceń lekarza.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od wilgoci.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Podmiot odpowiedzialny

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o. o.

ul. Spółdzielcza 25A, 11-001 Dywity

Pozwolenie nr IL-2067/ChF

Numer serii

Termin ważności

Informacja podana w systemie Braille'a

Glukoza

Kod kreskowy EAN UCC: 5905919043207