

Wskazania:

Niedobory magnezu występujące na różnym tle, szczególnie w okresach: zwiększonego zapotrzebowania na magnez, w przebiegu zaburzeń wchłaniania, w stresie i lękach, przy nadpobudliwości, biciu serca, wyczerpaniu psychicznym i fizycznym, zaburzeniach snu, osłabieniu pamięci, kurczach, drętwieniu i drżeniach kończyn, w okresie rekonwalescencji.

Lek jest skuteczny przy:

- niedoborach magnezu,
- przemęczeniu psychicznym i fizycznym, związanym z niedoborem magnezu,
- kurczach, drętwieniach, drżeniach kończyn,
- łamliwości paznokci,
- sytuacjach stresowych i lękach,
- w ciąży,
- karmieniu piersią,
- nadpobudliwości, zaburzeniach snu, zaburzeniach pamięci, kołataniu serca.



Działanie:

Lek ten zawiera niezbędne dla organizmu, biologicznie czynne składniki o szerokim zakresie działania. Poprzez pobudzenie wielu enzymów działa korzystnie na przemianę materii. Dzięki właściwej kompozycji składników lek

ten wyrównuje niedobory, a także powoduje zwiększenie przyswajania magnezu, bez obawy przedawkowania czy skutków toksycznych. Blokuje metale ciężkie.

Dawkowanie:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej : 2 tabletki do ssania rano i wieczorem, przynajmniej przez 2-3 miesiące, lub do ustąpienia objawów. Profilaktycznie stosować wiosną i jesienią każdego roku, przez 2- 3 miesiące. Dzieci- po konsultacji z lekarzem- połowa dawki.

Opakowanie:

Opakowanie 45 tabletek.

Postać leku:

Tabletki

Skład:

1 tabletka zawiera :Magnesia muriatica D1 , Magnesia phosphorica D1, Magnesia bromata D4, Plumbum mealicum D8, , Kalium phosphoricum D5 , Ambra grisea D8 .

Substancje pomocnicze: Sterynian magnezu, laktoza, skrobia ryżowa, sacharoza.

Informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego.

Pamiętaj :

- suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety
- nie używaj preparatu jeśli upłynął termin ważności podany na opakowaniu
- przechowuj leki w miejscu niedostępnym dla dzieci