

**Proponowany tekst na opakowaniu zewnętrznym bezpośrednim**  
**(butelka ze szkła barwnego z zakrętką z polietylenu z kroplomierzem z polietylenu)**

**Nazwa:**

**Jodyna**

**Nazwa powszechnie stosowana**

Iodi solutio spirituosas

Roztwór na skórę, 3 %.

Zawartość w opakowaniu: 20 g.

**Skład:**

Produkt zawiera:

- Iodum	3,00 g
- Potasu jodek	1,00 g
- Etanol 96%	90,00 g
- Woda oczyszczona	6,00 g

**Wskazania do stosowania:**

Zewnętrznie w niewielkich uszkodzeniach skóry, takich jak otarcia, zadrapania oraz w celu odkażenia nieuszkodzonej skóry, np. przed zabiegami.

**Przeciwwskazania:**

Odczyny alergiczne na jod, ciąża, laktacja. Dzieci w wieku noworodkowym i niemowlęcym, nietolerancja glutenu (choroba Duhringa).

**Interakcje:**

Może zaburzać badania czynności tarczycy, nie stosować ze związkami rtęci.

**Działania niepożądane:**

Miejscowe odczyny alergiczne. Przy stosowaniu na duże powierzchnie może wystąpić obrzęk skóry, wykwity o charakterze trądziku.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie

181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### **Środki ostrożności dotyczące stosowania:**

Chronić oczy. Ostrożnie przy przerwaniu ciągłości skóry, chorobach tarczycy. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

### **Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:**

O stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersią decyduje lekarz.

### **Droga podania i sposób stosowania:**

Otarte miejsca i bezpośrednie okolice ran przemywać 2-3 razy dziennie wacikiem nasączonym lekiem. Nie stosować na otwarte rany.

### **Przechowywanie:**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od światła.

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

### **Kategoria dostępności:**

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

### **Termin ważności:**

(miesiąc, rok)

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 42

86-031 Osielsko

**Numer pozwolenia:**

IL – 3130/ChF

**Numer serii:**

**Kod kreskowy EAN UCC:**

5909994313026