

WODA UTLENIONA

Hydrogenii peroxidum 3%

Roztwór na skórę i do płukania jamy ustnej

1000 g

Lek odkażający.

Skład: wodoru nadtlenek 30% (stabilizowany
pirofosforanem potasu, azotanem amonu,
kwasem 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowym,
cynianem sodu trójwodnym) 100 g
woda oczyszczona do 1000 g

Wskazania: dezynfekcja ran oraz zmienionej zapalnie błony śluzowej jamy ustnej.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Interakcje: brak.

Ostrzeżenia: chronić oczy. Ciąża i karmienie piersią: brak przeciwwskazań.

Sposób stosowania: zewnętrznie. W celu dezynfekcji ran stosować w postaci nierozcieńczonej, do odkażania błony śluzowej jamy ustnej 1 łyżkę wody utlenionej rozcieńczyć w szklance wody. W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: nie odnotowano. Osoby wykonujące zawód medyczny powinny zgłaszać pojedyncze przypadki działań niepożądanych produktu leczniczego ze względu na konieczność nieprzerwanego monitorowania jego stosowania. Zgłoszenie należy przekazać podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, faks: +48 22 49-21-309, strona internetowa <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek wydawany bez przepisu lekarza (OTC).

Pozwolenie nr IL-4893/ChF

Nr serii:

Termin ważności:

Farmina sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków

[Logo]

[Kod kreskowy EAN UCC] 5907529109502

[Zapis w systemie Braille'a: Woda utleniona]

WODA UTLENIONA

Hydrogenii peroxidum 3%

Roztwór na skórę i do płukania jamy ustnej

100 g

Lek odkażający.

Skład: wodoru nadtlenuk 30% (stabilizowany
pirofosforanem potasu, azotanem amonu,
kwasem 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowym,
cynianem sodu trójwodnym) 10 g
woda oczyszczona do 100 g

Wskazania: dezynfekcja ran oraz zmienionej zapalnie błony śluzowej jamy ustnej.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Interakcje: brak.

Ostrzeżenia: chronić oczy. Ciąża i karmienie piersią: brak przeciwwskazań.

Sposób stosowania: zewnętrznie. W celu dezynfekcji ran stosować w postaci nierozcieńczonej, do odkażania błony śluzowej jamy ustnej 1 łyżkę wody utlenionej rozcieńczyć w szklance wody. W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: nie odnotowano. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 49-21-301, fax. +48 22 49-21-309, strona internetowa <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek wydawany bez przepisu lekarza (OTC).

Pozwolenie nr IL-4893/ChF

Nr serii:

Termin ważności:

Farmina sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków

[Logo]

[Kod kreskowy EAN UCC] 5909990627479

[Zapis w systemie Braille'a: Woda utleniona]